



PATIENTENINFORMATION ZU GLIFLOZINEN

Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Packungsbeilage des Medikamentes, sondern will lediglich praktisch relevante Informationen für den Umgang mit dem Medikament zusammenfassen.

Grund für die Verordnung des Medikamentes

Sie leiden an einer Herzmuskelschwäche, die mit verschiedenen Medikamenten gleichzeitig behandelt wird. Dazu zählen auch Jardiance® (Wirkstoff Empagliflozin) und Forxiga® (Wirkstoff Dapagliflozin), die ursprünglich zur Behandlung einer Zuckerkrankheit entwickelt wurden. Auch ohne eine bestehende Zuckerkrankheit zeigen diese Medikamente sehr positive Wirkungen auf eine Herzmuskelschwäche. Das Medikament führt zu einer vermehrten Kochsalz- und Glukose = Zucker-Ausscheidung durch die Niere.

Art der Einnahme

Nehmen Sie täglich eine ungeteilte Tablette, wobei der Einnahmezeitpunkt nicht wichtig ist. Vor großen Operationen oder bei akuter schwerer Krankheit, Durchfall oder Erbrechen sollte das Medikament pausiert werden.

Typische Nebenwirkungen

Durch die Ausscheidung des Zuckers können vermehrt bakterielle Entzündungen der Harnwege (Blasenentzündung) auftreten. Zudem können (insbesondere bei Einnahme anderer Medikamente zu Behandlung einer Zuckerkrankheit) Unterzuckerungen auftreten. Sollte eine Zuckerkrankheit bekannt sein, sollten die Blutzuckerspiegel zu Behandlungsbeginn häufiger gemessen werden.