



PATIENTENINFORMATION ZU SACUBITRIL/VALSARTAN

Dieses Informationsblatt ersetzt nicht die Packungsbeilage des Medikamentes, sondern will lediglich praktisch relevante Informationen für den Umgang mit dem Medikament zusammenfassen.

Grund für die Verordnung des Medikamentes

Sie haben eine schwere Herzmuskelschwäche, die mit mehreren Medikamenten behandelt werden muss, eines davon ist Sacubitril/Valsartan (Entresto®).

Art der Einnahme

Das Medikament wird zweimal täglich eingenommen. Man startet mit einer niedrigen Dosis, um - soweit es seitens Ihres Blutdrucks möglich ist - schrittweise eine möglichst hohe Dosis zu erreichen. Die gleichzeitige Einnahme eines ACE-Hemmers (Enalapril, Ramipril, Lisinopril) darf auf keinen Fall erfolgen.

Typische Nebenwirkungen

Entresto® wirkt stark blutdrucksenkend. Eine Nierenfunktionsstörung kann zunehmen, weshalb eine Blutuntersuchung nach 2 Wochen erfolgen sollte. Andere Beschwerden (allgemeine Schwäche, Schwindel, Schwingelosigkeit) sind weniger Nebenwirkung als Ausdruck der blutdrucksenkenden Wirkung des Medikamentes. Ihr Körper wird sich im Verlauf einiger Tage bis Wochen an die niedrigeren Blutdruckwerte gewöhnen.